Trouver de nouveaux pulsars radio : 30Go pour une détection à 7 ou 8 sigma

Ismaël Cognard

icognard@cnrs-orleans.fr

G.Theureau, J.-M. Grießmeier, A.Lassus (PhD student), M.Serylak (post-doc)
LPC2E, CNRS - Université d'Orléans

La nébuleuse du Crabe et son pulsar

Le pulsar : le reste de l'explosion d'une grosse étoile

Comme
un phare au bord de la mer,
les faisceaux radio
interceptent
le radiotélescope
à chaque tour,
produisant
des impulsions régulières

Une stabilité exceptionnelle

Diagramme Période - Dérivée de la Période

Une première vie très courte...

Après une naissance à ~ 30 ms, le pulsar ralentit fortement et cesse d'émettre en quelques dizaines de millions d'années.

... puis l'éternité !

Ceux encore présents dans un système binaire se font ré-accélérer, et émettent à nouveau en radio, ce sont

les pulsars millisecondes recyclés à la stabilité de rotation exceptionnelle !

Alpar et al., Nature 300, 728 (1982)

De nombreuses applications

Une stabilité et une précision hors du commun

Alliée à la stabilité de rotation exceptionnelle des pulsars les plus rapides, l'excellence des instrumentations à dédispersion cohérente permet des mesures de temps d'arrivée des impulsions (ToAs) avec une précision pouvant atteindre ~ 30 ns.

De nombreuses applications

- recherche d'un fond d'ondes gravitationnelles
- tests des différentes théories de la Gravitation
- propagation et turbulence du milieu interstellaire
- évolution stellaire
- amas globulaires et potentiel gravitationnel de la Galaxie
- contraintes sur les éphémérides du système solaire
- détection de planètes extra-solaires
- processus d'émission des pulsars
- stabilité à long terme des échelles de temps terrestres
- raccordement des repères célestes (équatorial et écliptique)

Tests de la Relativité Générale

Pulsar double J0737-3039A

Pas moins de 5 paramètres post-Képlériens
'agreement with general relativity
within an uncertainty of 0.05%'
Kramer et al. Science 314, 97 (2006)

Détection d'un fond d'ondes gravitationnelles

Une superposition de sources...

Trous noirs binaires
super-massifs ($M \sim 10^{6-7} M_{\odot}$)

Corréler...

Sur un ensemble de pulsars
bien répartis sur le ciel,
il s'agit de chercher
un bruit corrélé
provenant de l'effet
des ondes gravitationnelles
sur la Terre.

→ Pulsar Timing Array
(PTA : EPTA, PPTA, ...)

l' 'EPTA' est une collaboration
des plus grands radiotélescopes européens

Cagliari, I, 64m, A.Possenti
Effelsberg, G, 100m, M.Kramer
Jodrell Bank, UK, 76m, B.Stappers
Nançay, F, ~100m, I.Cognard
Westerbork, NL, ~100m, J.Hessels

1967, les tous débuts...

Détection du premier pulsar en novembre 1967 à Cambridge
un amplificateur, un stylo sur un dérouleur de papier...
et de la patience pour inspecter des km de courbes !

Un problème... le milieu interstellaire est dispersif

Pulsar 1012+53 : P=5.25ms DM=9.0233 pc.cm⁻³
128x4MHz - ~532000 impulsions empilées (46mins)

un plasma froid et ionisé

décali temporel par rapport
à la fréquence infinie

$$t = k \frac{DM}{f^2}$$

avec $k = \frac{e^2}{2\pi m_e c}$

et DM la 'dispersion measure'
contenu électronique intégré
le long de la ligne de visée

$$DM = \int n_e dl \sim n_e D$$

Chercher des impulsions périodiques et dispersées

dans une matrice d'intensité radio (codée sur 1 à 4bits)
d'une centaine de canaux de fréquence ($\sim 1\text{MHz}$ chaque)
et d'une centaine de millions d'échantillons temporels ($\sim 30\mu\text{s}$ chaque)

Un programme de recherche de nouveaux pulsars à l'aveugle ?

Où et à quelle fréquence chercher ?

Quelle zone du ciel privilégier ?

le plan de la Galaxie ? les hautes latitudes galactiques ?

à basse fréquence les pulsars sont plus intenses

à haute fréquence le milieu interstellaire est moins limitant

Un traitement lourd

pour chaque observation (des milliers)

dédispenser pour quelques milliers de valeurs de dispersion (DM)

effectuer la Transformée de Fourier

fouiller parmi les milliers de candidats

pour ~ 100 candidats, empiler et optimiser les paramètres

sélectionner les meilleurs des ~ 100000 candidats pour des observations de confirmation

Dédisperser et intégrer les centaines de canaux

Dédisperser pour des milliers de DMs

Des algorithmes rapides ont été développés pour dédisperser rapidement pour plusieurs valeurs de dispersion (DM) en même temps.

Le choix de l'intervalle de DM dépend de la fréquence radio, de la largeur du canal individuel et de l'échantillonnage temporel.

La FFT d'une série temporelle dédispersée

Détection de fréquences de rotation potentielles (avec sommation des harmoniques)
Regroupement de ces multiples candidats similaires trouvés pour des DMs voisins

Les difficultés du traitement

Il y a quelques points durs dans l'analyse

- enlever les parasites dans la FFT
- regrouper les candidats obtenus à différentes valeurs de dispersion et sélectionner le mieux possible les candidats à optimiser
- rechercher les meilleurs candidats parmi les très nombreux proposés

Regarder les candidats par lot

On analyse simultanément plusieurs centaines d'observations avec une interface 'python' travaillant sur une base de données de candidats, pour lancer des visualisations détaillées, marquer des candidats intéressants, et reconnaître facilement les parasites indésirables...

Un parasite

Un parasite relativement facile à reconnaître car il est limité à un seul canal de fréquence

Un nouveau pulsar

Un pulsar milliseconde trouvé au radiotélescope de Nançay (fin 2009)
 Un fichier de 30Go de 128 canaux de 1MHz et 70×10^6 échantillons sur 4 bits
 pour une impulsion moyenne globale qui sort à 6.3σ au-dessus du bruit.

Recherche d'impulsions individuelles

Single pulse results for '/data/NBPP/work/15898003/15898003'

Source: "ContTrack"
Telescope: Nancy
Instrument: BPP
RA (J2000): 02:48:20.000
DEC (J2000): 60:34:35.000
MJD_{bary}: 50971.389189215995
N samples: 2016000
Sampling time: 60.00 μ s
Freq_{obs}: 1360.0 MHz

11-Dec-2008 20:19

On recherche aussi les impulsions individuelles intenses...

Conclusion

De très gros programmes de recherches systématiques de nouveaux pulsars sont en cours dans les plus grands radiotélescopes du monde. Ce sont des milliers d'observations pour un volume de données total qui se chiffre en centaines de To...
La découverte d'un pulsar en couple avec un trou noir sera la récompense ultime !